



Infoblad Doelsoorten

Vliegend hert

Het vliegend hert is de grootste kever van Nederland. Dankzij de imposante kaken kan het mannetje een lengte van wel 9 centimeter bereiken. De kaken dienen vooral om vrouwtjes en rivaliserende mannetjes mee te imponeren. Het vrouwtje bijt met haar kleinere maar scherpe kaken de schors van bomen waarna ze de boomsappen oplikt.

Vliegend herten zijn afhankelijk van inlandse eiken. Het vrouwtje legt haar eieren in dood, ondergronds eikenhout dat door schimmels is aangetast. Dat kan zowel staand als liggend hout zijn. Het kunnen hele oude bomen zijn, maar ook stronken van gekapte eiken.

Na een jaar of vier als larve in het hout te hebben geleefd, verpopt het vliegend hert zich in het najaar, om in mei en juni als volwassen kever tevoorschijn te komen. Het vrouwtje vliegt amper en legt bij voorkeur haar eieren in hetzelfde hout, of vlakbij de plek waar ze zelf vandaan komt. De kevers zijn maar enkele weken per jaar te zien, want na het paren en eieren leggen sterven ze.

Ook als volwassen kever voedt het vliegend hert zich met eiken: hij drinkt het sap uit wonden van eiken. Zulke wonden zijn ook vaak de plekken waar ze elkaar ontmoeten. Liefst zijn dit op een zuidhelling gelegen plekken waar de zon goed op valt en die snel opwarmen.

De combinatie van eiken en reliëf maken de Veluweranden met veel oude singels, bosjes en bomenrijen zeer geschikt leefgebied voor het vliegend hert.



De larven van het vliegend hert zijn afhankelijk van ondergronds, dood (eiken)hout dat door witrotschimmels is aangetast. Alleen dan kunnen zij het hout verteren.

Weetje




Wat kan ik doen voor het vliegend hert?

De belangrijkste voorwaarde voor vliegend hert is de aanwezigheid van voldoende voedsel voor de larven: ondergronds dood (eiken)hout dat is aangetast door witrot.

1. Laat dood eikenhout liggen. In houtwallen of bosstroken is er idealiter elke 100 meter één potentiële voortplantingsplek aanwezig van dood (eiken)hout, het liefst in de vorm van een stobbe met wortelkluit.
2. Beheer eiken als hakhout en laat het resthout liggen of graaf het deels in.
3. Laat kwijnende eiken staan. In houtwallen of bosstroken staat er idealiter elke 200 meter één kwijnende eik. Ook oude houten hekkenpalen of bielzen doen dienst als voedsel voor de larven van vliegend hert.
4. Maak een broedstoof. Bekijk [hier](#) hoe dat moet.

LET OP: het gaat om de inlandse eik, niet om de Amerikaanse.



Verspreiding vliegend hert in het werkgebied

Meer weten?

Zie www.boerennatuurveluwe.nl of neem contact op met je veldcoördinator.